METZOL®

Antibiotique et antiparasitaire

Dans quel cas le médicament METZOL® suspension buvable est-il prescrit ?

C'est un antibiotique et un antiparasitaire qui appartient à la famille des imidazolés.
Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies infectieuses ou parasitaires de l'intestin et de l'appareil génital.

Présentations du médicament METZOL® suspension buvable

METZOL® : suspension buvable ; flacon de 100 ml

Composition du médicament METZOL® suspension buvable

	p 5 ml
Métronidazole	125 mg

Contre-indications du médicament METZOL® suspension buvable

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux imidazolés.
Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

En cas d'urticaire ou de troubles nerveux, prévenez votre médecin avant de poursuivre le traitement.
Des précautions sont nécessaires chez les personnes ayant des antécédents d'anomalie de la numération formule sanguine.
Évitez l'absorption de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool pendant le traitement : risque d'effet antabuse.
La suspension buvable contient du sucre (saccharose) en quantité notable.

Interactions du médicament METZOL® suspension buvable avec d'autres substances

Ce médicament peut interagir avec les médicaments contenant du disulfirame.
Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un anticoagulant oral.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse. Un avis médical est bien sûr indispensable.

Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel : l'allaitement est déconseillé.

Mode d'emploi et posologie du médicament METZOL® suspension buvable

Ce médicament peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Posologie usuelle :

- Adulte : 500 mg à 1,5 g par jour, répartis en 2 ou 3 prises, selon la maladie.
- Enfant : la posologie varie en fonction de l'âge et du poids.

Conseils

Le médecin peut prescrire un prélèvement pour identifier le germe ou le parasite responsable de l'infection et tester sa sensibilité aux antibiotiques. Le résultat de cet examen peut être faussé en cas d'automédication préalable : ne prenez pas d'antibiotiques sans avis médical.
En cas d'infection génitale, votre partenaire peut être contaminé alors qu'il ne présente aucun symptôme. S'il n'est pas traité conjointement, une recontamination est possible.
La coloration brun-rouge des urines est normale.

Effets indésirables possibles du médicament METZOL® suspension buvable

Nausées, vomissements, diarrhée. Goût métallique dans la bouche, manque d'appétit.
Exceptionnellement :

- urticaire, inflammation de la bouche ;
- maux de tête, vertiges, confusion des idées, convulsions ;
- pancréatite réversible à l'arrêt du traitement.